fait àconserver

Observations sur une hydrocele.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C. 26 N. 32

Le 14 fevrier je fis l'ouverture du cadavre d'un bas-breton trouvé mort le 13 hors de la ville. L'engorgement excessif des vaisseaux du cerveau ne permit pas de douter qu'il avait été victime d'une attaque d'apoplexie. Une tumeur au côté gauche du scrotum, que nous jugeâmes une hydrocele, piqua notre curiosité. J'extirpai le testicule, et en incisant la poche par sa partie antérieure le hazard voulut que l'incision ne divisât que la tunique vaginale seule, il ne sortit aucun fluide, et j'apperçus aussitôt que cette tunique était contigue à une poche placée dans son intérieur et remplie d'une humeur très limpide, et que je crois pouvoir nommer une hydrocele de la tunique albuginée.

La poche adhérante au testicule, a une figure pyriforme, trois pouces de hauteur, un pouce vingt lignes de diametre vers son tiers inférieur, et un pouce quinze lignes vers son tiers supérieur. L'étendue de son adhérance à la partie antérieure et supérieure du testicule, m'a paru avoir un pouce de diametre, on voit dans cet endroit qu'elle se continue avec l'albuginée, et plusieurs vaisseaux sanguins rampent dans l'épaisseur des parois de ce kiste. Je n'ai point voulu porter l'examen plus loin, une main plus habile se chargera de l'examen de la piece, dont je me suis contenté d'injecter le conduit déférent, mais le mercure n'a me parait pas avoir pénétré fort avant dans l'epididime.

Sharp nie cette espece, parce qu'il ne l'a jamais vue (a). Petit (b) Pott (c) n'en font point mention. Ledran (d) parait au premier coup d'oeil décrire cette espece en définissant l'hydrocele une vesie aqueuse placée sur l'un des testicules auquel elle est adhérante, mais sa description n'est point assez exacte, et le conseil qu'il donne d'emporter dans certaines circonstances une partie du

(a) operat. p. 143. (b) oeuvr. posthume t. II. p. 483. (c) oeuvres t. II. (d) operat. p. 177.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 18 d. 5 n° 33

Kiste avec la peau du Scrotum dissipade entièrement de l'idée que les expressions auraient pû faire naître, à La Verité Ce grand homme en rapportant l'observation d'une Complication de trois hydroceles dans le même Sujet, dit que l'une était Sous la Tunique albuginense (a) mais il n'a pas décrit assez exactement l'état des parties quoiqu'il eut la pièce entre Les mains pour qu'on puisse rien affirmer Sur Son témoignage, et C'est avec Raison que Sharp regarde ce cas Comme trop obscur pour qu'on en puisse tirer parti. (b)

Fabrice d'Aquapendente est le Premier au Rapport de Morgagni qui ait décrit Cette espèce, observée par Valsalva (c) mais que Son illustre commentateur ne croit point qu'il ait voulu décrire (d). Lui même cependant l'a rencontrée une fois (e), Mais ne doit-on pas Rapporter à Cette espèce les hydatides trouvées dans la Cavité De la Tunique vaginale Tantot libres dans le fluide constituant L'hydrocele (f) D'autrefois ayant acquis la Dureté du calcul (g) Si toutes fois Je puis attribuer Ces calculs à la metamorphose d'une hydatide d'après L'exemple (h) d'une hydatide libre dont le Centre était un Noyau Dure ossea duritie. On trouve Ces hydatides assez Souvent adhérantes par une pedicule grêle à la Tunique albuginée (i) et la Rupture de ce pedicule par une cause quelconque les Rend libres, mais le plus ordinairement On les voit adhérantes à la Tunique propre du Testicule.

Ces hydatides ne sont-elles pas formées dans l'épaisseur de la Tunique albuginée distendue par une cause quelconque qui détermine l'accumulation de la lymphe peut-être dans un des vaisseaux Lymphatiques qu'on y voit ramper. (l) Cette Tunique a été séparée en deux Lames facilement (m) en trois par Teichmeyer, en ne la Considérant que Comme une production du péritoine qui n'est formé que d'une seule Lame, on Serait porté à n'y en admettre qu'une, si Le Celebre Morgagni ne nous donnait L'exemple de la Reserve que doit avoir avant de prononcer definitivement à cet égard, Equidem ex iis non sum, dit Ce grand homme, (n) qui conjunctas sibi fortiter Tunicas dividendo, earum numerum Conantur augere, sed ne que tamen ex iis sum qui, quæ hâc ratione divisa Cernuntur, ea quoque Conjungenda esse, existimant. il est évident que dans l'exemple cité plus haut La Lymphe Renfermée dans la Tunique vaginale était Séparée de la Substance du Testicule par une Membrane très mince, et nous pensons que La même Chose a lieu dans Le fait que nous rapportons. Ces hydatides peuvent Se rompre, épanchent L'humeur dans la Cavité vaginale et donnent lieu quelquefois à L'hydrocele de Cette Tunique (o)

(a) Ley. T. II. p. 159. (b) Recherches Critiq. p. 106. (c) Morg. de sed. et Caus. Epist. XX. n° 26. (d) Id. Epist. 20. n° 27. (e) Morgagni Epist. 43. n° 31. (f) Epist. 43. n° 25. (g) Epist 64. n° 7. (h) Epist. 43. n° 25. (i) Epist. 43. n° 19. (l) Haller Element. Physiol. T. VII. (m) Morg. Ep. 43. n° 31. (n) adversaria IV. p. 3. (o) Morgagni Epist. 43. n° 16. 17.

après leur Rupture revenant sur elles-mêmes, elles forment ces tubercules plus ou moins saillans observés sur l'albuginée dans les hydroceles vaginales (a). tubercules qui étant volumineux dans quelques circonstances ont pû en imposer pour des maladies du testicule, pour des excroissances aux praticiens qui tentait la cure par l'incision. A la vérité on pourra objecter qu'on a trouvé ces tubercules sans accumulation marquée dans la cavité vaginale (b) mais alors ne serait pas permis de croire avec Morgagni que l'hydatide rompue s'est contractée pour former le tubercule et que l'humeur épanchée a été resorbée par les vaisseaux de la tunique vaginale &c (c)

Si l'on en croit Garengeot (d) d'Armand a fait la ponction à une hydrocele sous l'albuginée, mais on ne peut rien statuer sur un fait presenté aussi vaguement. Si ce même auteur eut donné avec un peu plus de détail sa 28e. observation (e) ne pourrait-on pas penser d'après le fait que je rapporte qu'il y avait hydrocele dans la cavité vaginale, et hydrocele dans un kist à peu près semblable au mien, que ce kist percé par la seconde ponction et revenu sur lui-même, a contribué à l'accumulation qui détermina au bout de six mois à une seule ponction qui s'avança tout. Les observations d'hydatides dans la cavité vaginale avec hydrocele, hydatides qui sont susceptibles de devenir volumineuses, pourraient donner quelque vraisemblance à cette opinion. Si nous ne la donnions pas pour une simple conjecture, enfantée par le désir ~~trop~~ de tout expliquer si pardonnable aux eleves de mon âge à qui l'expérience n'a point encore assez appris qu'il faut observer et se taire le plus souvent sur les explications.

Ne suis-je point endroit de conclure que ces auteurs ont eu tort de le[r] dire l'hydrocele de la tunique vaginale, que c'est à tort que Bertrandi a avancé que les faits favorables à cette opinion prouvaient que la dissolution putride ou une vraie suppuration du testicule avait précédé. (f)

(a) morgagni Epist. 21. no. 19. Epist. 43. No. 24. 28. ~~Epist. 2[illegible]~~.
(b) morgagni Epist 43. no. 22. 24. 27. 29. 30. Epist. 40. no. 22. Epist. 64. no. 7. Epist. 24. no. 16. (c) Epist 43 no. 30. (d) operat. T. 1 p. 473. (e) L. c. p. 468.
(f) mém. acad. de chirurg. T. 9.

N.° 83

Les Signes de Cette espece d'hydrocele Sont Ceux ~~de celle~~ de la Tunique vaginale quand la tumeur a acquis un Certain volume, dans Le principe une Elevation plus ou moins distincte Sur le Testicule Sans aucun accident pouvant La faire Soupçonner mais Le Diagnostic Sera toujours très obscur.

La ponction en evacuant le Kiste peut être Suivie de sa retraction qui terminant La Source de l'hydrocele Sera suivie d'une cure radicale, mais Ce Cas Sera très rare pour ne pas dire impossible, Car Je pense que Les parois du Kiste distendues au point ~~de~~ de nécessiter la ponction ne Seront plus en état de se contracter en Tubercule, mais Se desorganiseront, occasionneront une inflammation Suivie d'un peu de Suppuration due pour Lors en plus grande partie a la Dissolution du Kiste, et ~~Secrette~~ La cure radicale pourra en être la suitte.

En pratiquant L'incision, si Ce cas était plus fréquent, Ce Serait Sans doute à Tort que Sharp reprocherait à Ledran et à Garengeot d'avoir conseillé de ne pas ménager Le Kiste, Car rien ne Serait plus facile que de L'enlever entièrement.

En mettant en usage Le procédé de Pott, Ce Kiste en Se désorganisant pourra fournir une Suppuration plus abondante que Celle que Cet illustre auteur a observée.

Telle est Le fait que J'ai Cru digne d'être présenté à L'académie, C'est à elle a prononcer Sur la Nature de Cette Maladie, Si Je me Suis Trompé dans Le précis que J'en ai donné, elle pardonnera mon erreur à mon peu d'experience et de Reflexion, et Son indulgence applaudira peut-être à mon Zele.

a Bitche le 22. fevrier 1782.

Rougemont

Chir. aide-major demonstrateur
de L'hopital militaire,

(La tumeur, grosse comme un œuf étoit assortie au testicule dans une cavité equivalente à une pièce de 24 sols, et peut être un peu moins, du coté de la tête de ce corps et de celle de l'epididyme. nous avons pu la séparer entièrement du testicule. elle paroissoit formée par la tunique vaginale qui formoit un cul-de-sac du coté par où elle répondoit dedans de la cavité de cette tunique vaginale.)